

A leánykökőrcsin a száraz gyepek egyik legkorábban nyíló tavaszi virága. Lágyszárú, évelő növény. A szárazsághoz alkalmazkodva több méter mély gyökeret ereszt. Védett növény, így leszedni, kiásni és hazavinni szigorúan tilos!

LEÁNYKÖKÖRCSIN
Pulsatilla grandis



KISVIRÁGÚ RÓZSA
Rosa micrantha

A kisvirágú rózsza a száraz tölgyesek, erdőszegélyek, legelők, valamint mezsgyebokrosok ritka faja. A semleges talajt és a napos helyeket kedveli. Júniustól júliusig virágzik. Tavasszal és virágzáskor az egész bokor zöldalma illatú.

A tőzgepáfrány vagy mocsári páfrány közepes termetű, nagy nedvesség és páraigényű növény. Mocsarak, nedves rétek, folyópartok, út menti árkok mentén, árnyékos helyen él. Tőzegjelző növény - kizárólag olyan helyeken él meg, ahol tőzegképződés folyik, illetve tőzeges a talaj.

TŐZGEPÁFRÁNY
Thelypteris palustris



MÁCSONYA
Dipsacus sp.

A mácsonyaformák nedves területeken fordulnak elő. A legismertebbek a héjakút mácsonya (*D. laciniatus*), az erdei mácsonya (*D. fullonum*) és a takácmácsonya (*D. sativus*). A mácsonya összenőtt leveleiben az esővíz összegyűlik, itatóhelyet biztosítva a szomszédos madaraknak.

Az orvosi székfű vagy kamilla az egyik legismertebb gyógynövény. Mezőkön, útszéleken, szikes pusztákon, parlagokon él. Számos gyógyhatása ismert, külsőleg és belsőleg is használható. Teája nemcsak a légutakat tisztítja, de gyulladásgátló, nyugtató anyagokat is tartalmaz.

KAMILLA
Matricaria chamomilla



ZÖLD GYÍK
Lacerta viridis

A zöld gyík a legnagyobb méretű őshonos gyík-fajunk. Főleg rovarokkal és más apró állatokkal, például csigákkal vagy férgekkel táplálkoznak. A zöld gyíkoknak napos és változatos élőhelyre van szükségük, például kőhalmokra vagy kiszáradt farönkökre.

Közép-Európa legnagyobb bogara. A kifejlett bogarak növényi nedvekkel táplálkoznak, míg a lárvák korhadó fák belsejében növekednek. A hím bogarak impozáns agancsa a szájszervükből alakul ki. A szarvak táplálékfelvételre azonban teljesen alkalmatlanok.

NAGY SZARVASBOGÁR
Lucanus cervus



FADONGÓK
Xylocopa sp.

A fadongók a legnagyobb vadméheink, akár 3 cm hosszúra is megnőhetnek. Nem kell félni tőlük! Van ugyan fullánkjuk, de igazán békések. A kifejlett méhek nyár végén kelnek ki. Korhadó fákban telnek át. Más vadméhekhez hasonlóan fontos szerepet töltenek be a növények beporzásában.

Magyarországon 28 denevérfaj él. A különösen veszélyeztetett fajok közé tartoznak, és mindegyik szigorú védelem alatt áll. Megfigyelhetők lakóövezetekben és kertekben egyaránt. Az összes európai denevérfaj rovarevő: főként szúnyogokkal és lepkékkel táplálkoznak.

DENEVÉREK
Chiroptera



FARKASALMALEPKE
Zerynthia polyxena

A farkasalmalepke a hernyó tápnövényeiről, a farkasalmafélékről kapta a nevét, mivel mindig annak közelében fordul elő. A fiatal hernyók a növény virágát fogyasztják, míg az idősebb példányok a levelét kedvelik. A kifejlett lepke a hernyójával ellentétben nem válogatós.

A pirregő hangon éneklő zöld varangy éjszakai életmódot folytat. Lepkével, pókokkal, férgekkel és kis csigákkal táplálkozik. Szívesen telepszik meg sekély, növényzetben szegény természetes vizekben és víztestekben, ahol elhelyezheti az akár 8 m hosszú petezsinórait.

ZÖLD VARANGY
Bufo viridis



KIS FAKOPÁNC
Dendrocopos minor

A kis fakopáncs a legkisebb európai harkályfaj. A nagyobb méretű rokonaival ellentétben nem igazi „fakopáncs”, mivel nem a fában, hanem a fák tetején lévő ágakon és leveleken kutat rovarok után. Kicsi csőre miatt a fészke építéséhez a puha, korhadó fákat részesíti előnyben.